



NICHINO

PORTAL[®]
ACARICIDA/INSECTICIDA

LA TECNOLOGÍA
ACARICIDA QUE TUS
CULTIVOS NECESITAN.

Ingrediente Activo:

Fenpiroximato al 5% (47.5 g/L)

Modo de Acción:

Inhibidor de la respiración por contacto directo y con poder residual.

Mecanismo de Acción:

Inhibidor del transporte de electrones en el complejo mitocondrial I (IRAC 21A).

Zona Golfo: Ing. Miguel Broca López
cel. +52-55-8046-2257

Zona Pacífico Norte: Ing. Sergio González Tafoya
cel. +52-55-8064-7442

Zona Pacífico Centro: Ing. Héctor Miguel López Acosta
cel. +52-55-2742-4734

Para más información:



Nichino México

www.nichino.com.mx



¡Escanéame!






PORTAL®

ACARICIDA/INSECTICIDA

LLEVA TUS CULTIVOS A UN FUTURO SIN PLAGAS.

Portal, con una formulación más efectiva para su uso en cítricos, que lo diferencia de los competidores. Derriba ácaros y *Diaphorina citri* en todas las etapas de su ciclo biológico. Detiene el daño por alimentación y ovoposición a las pocas horas de la aplicación. Bajo impacto en organismos benéficos.

LÍMITES MÁXIMOS DE RESIDUOS

	Intervalo a cosecha (Días) (PHI)	 Estados Unidos	 Canada	 Unión Europea	 Japon	 Korea
Lima	3	1.0	1.0	0.5	2.0	0.01
Limón	3	1.0	1.0	0.5	2.0	0.7
Naranja	3	1.0	1.0	0.5	2.0	0.7
Mandarina	3	1.0	1.0	0.5	2.0	0.7
Toronja	3	1.0	1.0	0.5	2.0	0.7

RECOMENDACIONES DE USO

Cobertura

Es necesario tener una buena cobertura al asperjar, debido a que es un producto de contacto.

Tiempo de aplicación

Se recomienda dos aplicaciones con intervalo de 7 a 14 días de acuerdo a la incidencia de la plaga. Período de reingreso 12 h.

Rotación

Planea en tu plan de Manejo integral de plagas, la rotación con otros modos de acción.

Dosis recomendada


Diaphorina citri:
1 a 1.25 L/ha
Ácaros:
1.5 a 2.5 L/ha

CONTROL DE PLAGAS:

- Negrilla (*Phyllocoptruta oleivora*)
- *Araña roja: (*Panonychus citri*)
- *Ácaro Rojo (*Tetranychus Urticae*)
- *Ácaro blanco (*Polyphagotarsonemus latus*)
- Psílido Asiático (*Diaphorina citri*)
- *Chicharritas



Testigo



Con Portal

*. Se ha comprobado control en estudios de Dictamen Técnico y pruebas de campo. El registro de este uso específico se encuentra en Trámite ante COFEPRIS.

NICHINO

©2021 Nichino America, Inc. Todos los derechos reservados. Portal y Nichino Mexico son marcas comerciales de Nichino America, Inc. La marca Fujiiichi es una marca comercial de Nihon Nohyaku, Co., Ltd. Todas las demás marcas son propiedad de sus respectivos dueños.

GUÍA DE ROTACIÓN CÍTRICOS

PORTAL[®]
ACARICIDA/INSECTICIDA

Nombre común y científico	<i>Phyllocoptruta oleivora</i> <i>Panonychus citri</i> <i>Pollyphagotarsonemus latus</i> <i>Tetranychus urticae</i>	<i>Diaphorina citri</i>
Dosis L PF/Ha de área foliar	1.5-2.5 L/ha	1.0-1.25 L/ha
Numero de aplicaciones máximo por año	1-2 en rotación	2-3 en rotación
Rotación ingredientes activos - manejo resistencia	Azufre, Jabones, Abamectina (6), Cyflumetofen (25A), Spiromesifen (23)	Ciantraniliprol (28) Flupyradifurone (4D) Spirotetramat (23) Imidacloprid (4A) Tiametoxan (4A) Flonicamid (9C) Piretroides (3A)



Portal - IRAC 21A

IMPORTANTE: Para manejo de resistencia no se puede rotar con: Fenazaquin, Pyradaben, u otros I.A. del grupo IRAC 21A.



NICHINO