

ANTES DE USAR EL PRODUCTO, LEA LA ETIQUETA
USO AGRÍCOLA

Kabuki®

HERBICIDA

piraflufen etil
Herbicida – Concentrado Emulsionable

COMPOSICIÓN PORCENTUAL

% EN PESO

INGREDIENTE ACTIVO:

Piraflufen etil: etil 2-cloro-5-(4-cloro-5-difluorometoxi-1-metilpirazol-3-il)-4-fluorofenoxiacetato
(Equivalente a 25.75 g i.a./L)

2.50%

INGREDIENTES INERTES:

Solventes y emulsificantes

97.50%

TOTAL:

100.00

NÚMERO DE REGISTRO: RSCO-HEDE-0202G-301-009-003

Contenido Neto: 100 mL



Nocivo si se inhala

Lote y fecha de fabricación
en el cuello de la botella

Fecha de caducidad:
2 años a partir
de la fecha de fabricación

TITULAR DEL REGISTRO E IMPORTADOR:

SOJITZ MEXICANA, S.A. de C.V.
Presidente Masaryk 101-802,
Col. Polanco V Sección. CP. 11560,
Ciudad de México
Teléfono: (55) 5202 7468

DISTRIBUIDO POR:

Nichino México, S. de R.L. de C.V.
Durango 263, Piso 10
Colonia Roma, Cuauhtémoc
Ciudad de México
Teléfono: (55) 3300 7300

 **NICHINO MÉXICO**

MX3003 11/20

HECHO EN JAPÓN Y/O ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

“ALTO, LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”

“PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO”

Al manejar y manipular el producto use el equipo de protección adecuado: gorra o sombrero, gafas, mascarilla, guantes y botas de neopreno que solo se destinen para el manejo y aplicación de plaguicidas. No coma, beba o fume durante su aplicación y manejo, antes y después de hacerlo, lávese perfectamente con agua corriente y jabón. No destape boquillas con la boca. No aplique contra el viento ni cuando este favorezca el acarreo del material. Evite el contacto directo con la piel, boca, ojos, ropa y la inhalación del producto. Después de una jornada de trabajo báñese y use ropa limpia. Lave la ropa contaminada con agua y jabón antes de volverla a usar.

“PRECAUCIONES DURANTE EL MANEJO DEL PRODUCTO”

- “NO COMA, BEBA O FUME CUANDO ESTÉ UTILIZANDO ESTE PRODUCTO”
- “NO SE TRANSPORTE NI ALMACENE JUNTO A PRODUCTOS ALIMENTICIOS, ROPA O FORRAJES”
- “MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS, MUJERES EMBARAZADAS, EN LACTANCIA Y ANIMALES DOMÉSTICOS”
- “LÁVESE LAS MANOS DESPUÉS DE UTILIZAR EL PRODUCTO Y ANTES DE CONSUMIR ALIMENTOS”
- “NO ALMACENE EN CASAS HABITACIÓN”
- “NO USE EL PRODUCTO SIN EL EQUIPO DE PROTECCIÓN ADECUADO”
- “LOS MENORES DE 18 AÑOS NO DEBEN MANEJAR ESTE PRODUCTO”
- “AL FINAL DE LA JORNADA DE TRABAJO BÁÑESE Y PÓNGASE ROPA LIMPIA”
- “NO SE INGIERA, INHALE Y EVÍTESE EL CONTACTO CON LOS OJOS Y PIEL”
- “NO MEZCLE O PREPARE EL PRODUCTO CON LAS MANOS, USE GUANTES, USE UN TROZO DE MADERA U OTRO MATERIAL APROPIADO”
- “NO DESTAPE LA BOQUILLA CON LA BOCA”

“EN CASO DE INTOXICACIÓN, LLEVE AL PACIENTE CON EL MÉDICO Y MUÉSTRELE ESTA ETIQUETA”

PARA MAYOR INFORMACIÓN LLAME AL SERVICIO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA (SINTOX), PARA EL ÁREA METROPOLITANA A LOS TELÉFONOS (55) 5598 6659 Y (55) 5611 2634 Ó DEL INTERIOR DE LA REPÚBLICA LADA SIN COSTO AL 01 800 00 92800 LAS 24 HORAS, LOS 365 DÍAS DEL AÑO.

“PRIMEROS AUXILIOS”

Si el producto es ingerido.- No induzca al vómito, suministre un vaso con agua y consiga atención médica inmediatamente. Si la persona está inconsciente, asegúrese que pueda respirar sin dificultad y NO provoque el vómito, evite la introducción de cualquier objeto por la boca. Evite el alcohol.

Piel.- Quite la ropa o equipo contaminado y lave la parte afectada con abundante agua y jabón.

Ojos.- Enjuáguese con abundante agua por lo menos durante 15 minutos, si la irritación persiste consulte a un médico.

En caso de inhalación.- Ponga a la persona en un lugar fresco y ventilado. Mantenga al paciente en reposo.

“RECOMENDACIONES AL MÉDICO”

Grupo Químico.- Fenilpirazoles.

Signos y Síntomas de intoxicación - La ingestión accidental de este producto puede causar irritación al tracto gastrointestinal, vómito, diarrea, así como reacciones alérgicas a personas sensibles. La inducción del vómito puede causar pulmonía respiratoria.

Tratamiento - No se conoce antídoto específico, en caso de intoxicación el tratamiento es sintomático y administre terapia de apoyo. El probable daño a las mucosas puede contraindicar el uso de un lavado gástrico.

“MEDIDAS DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE”

- “DURANTE EL MANEJO DEL PRODUCTO, EVITE LA CONTAMINACIÓN DE SUELOS, RÍOS, LAGUNAS, ARROYOS, PRESAS, CANALES O DEPÓSITOS DE AGUA, NO LAVANDO O VERTIENDO EN ELLOS RESIDUOS DE PLAGUICIDAS O ENVASES VACÍOS”
- “MANEJE EL ENVASE VACÍO Y LOS RESIDUOS DEL PRODUCTO CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA LEY GENERAL PARA LA PREVENCIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS, SU REGLAMENTO O AL PLAN DE MANEJO DE ENVASES VACÍOS DE PLAGUICIDAS, REGISTRADO ANTE LA SEMARNAT”
- “EL USO INADECUADO DE ESTE PRODUCTO PUEDE CONTAMINAR EL AGUA SUBTERRÁNEA. EVITE MANEJARLO CERCA DE POZOS DE AGUA Y NO APLICAR EN DONDE EL NIVEL DE LOS MANTOS ACUÍFEROS SEA POCO PROFUNDO (75CM DE PROFUNDIDAD) Y LOS SUELOS SEAN MUY PERMEABLES (ARENOSOS)”
- “EN CASO DE DERRAMES, SE DEBERÁ USAR EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL Y RECUPERAR EL PRODUCTO DERRAMADO CON ALGÚN MATERIAL ABSORBENTE (POR EJEMPLO TIERRA O ARCILLA), COLECTAR LOS DESECHOS EN UN RECIPIENTE HERMÉTICO Y LLEVARLO AL CENTRO DE ACOPIO DE RESIDUOS PELIGROSOS AUTORIZADO MÁS CERCAÑO”
- “REALICE EL TRIPLE LAVADO DEL ENVASE VACÍO Y VIERTA EL AGUA DE ENJUAGUE EN EL DEPÓSITO O CONTENEDOR DONDE PREPARE LA MEZCLA PARA APLICACIÓN”
- “ESTE PRODUCTO ES **ALTAMENTE** TÓXICO PARA LOS INVERTEBRADOS ACUÁTICOS”.

“GARANTÍA”

Sin perjuicios a lo establecido en la Ley Federal de Protección al consumidor, **NICHINO MÉXICO, S. de R.L. de C.V.** garantiza que el producto, en su envase original sellado, cumple con las especificaciones anotadas en esta etiqueta. Sin embargo, como el almacenamiento, uso y transporte quedan fuera de nuestro control, declinamos toda responsabilidad por daños eventuales que pueden producirse por cualquier causa a consecuencia del uso y almacenamiento. No otorgamos ninguna garantía expresa o implícita.

“ÚSESE EXCLUSIVAMENTE EN LOS CULTIVOS Y PLAGAS AQUÍ RECOMENDADOS”

“INSTRUCCIONES DE USO” “SIEMPRE CALIBRE SU EQUIPO DE APLICACIÓN”

Información General. KABUKI® es un herbicida inhibidor protoporfirinógeno que inhibe la enzima protoporfirinógeno IX oxidasa (PPO) causando que la membrana celular se vuelva necrótica y muera. Se recomienda su aplicación en los siguientes cultivos y para el control de las siguientes malezas:

| CULTIVO | MALEZA | | DOSIS | OBSERVACIONES |
|------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|-----------|--|
| | Nombre común | Nombre científico | (mL/ha) | |
| Maíz (SL) | Lechosilla | <i>Euphorbia hirta</i> | 100 | En mezcla con 2.0 L/ha de Glifosato*. Aplicación en post-emergencia de la maleza y preemergencia del cultivo. |
| | Lechosa | <i>Euphorbia heterophylla</i> | | |
| | Quelite | <i>Amaranthus hybridus</i> | | |
| | Manto | <i>Ipomoea purpurea</i> | | |
| | Verdolaga | <i>Portulaca oleracea</i> | | |
| Limón Cidro Lima | Bejuco o campanita | <i>Ipomoea triloba</i> | 100 - 200 | Aplicación en mezcla de tanque con 2 – 3 L/ha de Glifosato. Realizar una aplicación en forma de aspersión dirigida a la maleza en crecimiento activo (10-20 cm de altura). |
| | Zacate pata de pollo o zacate egipcio | <i>Dactyloctenium aegyptium</i> | | |
| | Zacate plumilla | <i>Leptochloa panicea</i> | | |
| | Zacate de agua o zacate arrozillo | <i>Echinochloa colonum</i> | | |
| Mandarino | Balsilla | <i>Phyllanthus niruri</i> | 100 - 200 | Aplicación en mezcla de tanque con 2 – 3 L/ha de Glifosato. Realizar una aplicación en forma de aspersión dirigida a la maleza en crecimiento activo (10-20 cm de altura). |
| Naranja | Bejuco/Campanita | <i>Ipomoea triloba</i> | | |
| Tangerino | Hierba del conejo | <i>Tridax procumbens</i> | | |
| Toronjo (1) | Hierba ceniza | <i>Lagascea mollis</i> | | |
| | Golondrina | <i>Euphorbia hirta</i> | | |
| | Vergonzosa | <i>Mimosa pudica</i> | | |
| | Malva/Escobilla | <i>Sida acuta</i> | | |

* La aplicación se debe realizar únicamente en mezcla con glifosato 41% (365 g i.a./L) en solución acuosa.

() **Intervalo de seguridad:** Días que deben transcurrir entre la última aplicación y la cosecha.

SL = Sin límite.

Tiempo de reentrada a las áreas tratadas: 24 hr.

| CULTIVO | FUNCIÓN | DOSIS | OBSERVACIONES |
|-----------|------------------------------------|-----------------|---|
| Papa (SL) | Desecante de hojas y tallos verdes | 200 - 300 mL/ha | Realizar la aplicación en aspersión foliar con buena cobertura en el momento que desee desecar el cultivo. La desecación se presenta dependiendo de la intensidad de la luz solar, entre 5 y 10 días posteriores a la aplicación. |

() **Intervalo de seguridad:** Días que deben transcurrir entre la última aplicación y la cosecha.

SL = Sin límite.

Tiempo de reentrada a las áreas tratadas: 24 horas después de la aplicación.

MÉTODOS PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO

Para abrir el envase, rompa el sello plástico que cubre la tapa y agregue el producto al tanque de la mezcla. **KABUKI®** se aplica por aspersión foliar utilizando el equipo terrestre que asegure un buen cubrimiento del área a tratar. Llene el tanque con la mitad del agua a utilizar, agregue la cantidad necesaria de **KABUKI®** y enjuague los envases vacíos 3 veces con suficiente agua. Agregue el caldo del lavado al tanque y termine de llenar con el total de agua, mantenga la mezcla en agitación constante y durante la aplicación. Aplicar las mezclas de tanque con glifosato únicamente en pre-emergencia del cultivo y sobre las malezas en crecimiento. Aplicar las mezclas de tanque con herbicidas pre-emergentes únicamente en pre-emergencia del cultivo y pre-emergencia de las malezas.

CONTRAINDICACIONES

No aplicar cuando la maleza está bajo estrés por falta de humedad. No aplicar con vientos mayores de 10 km/h para evitar la deriva del producto hacia cultivos o plantas susceptibles. Se recomienda aplicar bajo condiciones de alta luminosidad.

FITOTOXICIDAD

KABUKI® no causa fitotoxicidad a los cultivos cuando el producto es utilizado de acuerdo a las indicaciones de esta etiqueta.

INCOMPATIBILIDAD

No mezclar con agroquímicos de fuerte reacción alcalina. Si se desea mezclar, la mezcla se hará con productos registrados en los cultivos recomendados en esta etiqueta, sin embargo es necesario realizar una prueba de compatibilidad previa a la aplicación.

MANEJO DE RESISTENCIA

PARA PREVENIR EL DESARROLLO DE POBLACIONES RESISTENTES, SIEMPRE RESPETE LAS DOSIS Y LAS FRECUENCIAS DE APLICACIÓN; EVITE EL USO REPETIDO DE ESTE PRODUCTO, ALTERNÁNDOLO CON OTROS GRUPOS QUÍMICOS DE DIFERENTES MECANISMOS DE DESTOXIFICACIÓN Y MEDIANTE EL APOYO DE OTROS MÉTODOS DE CONTROL.