



Zona Pacífico Norte: Ing. Sergio González Tafoya cel. +52-55-8064-7442

Zona Pacífico Centro: Ing. Héctor Miguel López Acosta cel. +52-55-2742-4734

Para más información:





in Nichino México

www.nichino.com.mx





LLEVATUS CULTIVOS A UN FUTURO SIN PLAGAS.

Portal, con una formulación más efectiva para su uso en cítricos, que lo diferencia de los competidores. Derriba ácaros y *Diaphorina citri* en todas las etapas de su ciclo biológico. Detiene el daño por alimentación y ovoposición a las pocas horas de la aplicación. Bajo impacto en organismos benéficos.

LÍMITES MÁXIMOS DE RESIDUOS

	Intervalo a cosecha (Días) (PHI)	Estados Unidos	Canada	Unión Europea	Japon	″ ● ¾ Korea
Lima	3	1.0	1.0	0.5	2.0	0.01
Limón	3	1.0	1.0	0.5	2.0	0.7
Naranja	3	1.0	1.0	0.5	2.0	0.7
Mandarina	3	1.0	1.0	0.5	2.0	0.7
Toronja	3	1.0	1.0	0.5	2.0	0.7

RECOMENDACIONES DE USO

Cobertura

Es necesario tener una buena cobertura al asperjar, debido a que es un producto de contacto.

Tiempo de aplicación

Se recomienda dos aplicaciones con intervalo de 7 a 14 días de acuerdo a la incidencia de la plaga. Período de reingreso 12 h.

Rotación

Planea en tu plan de Manejo integral de plagas, la rotación con otros modos de acción.

Dosis recomendada

Diaphorina citri: 1 a 1.25 L/ha Ácaros: 1.5 a 2.5 L/ha

CONTROL DE PLAGAS:

- Negrilla (Phyllocoptruta oleivora)
- *Araña roja: (Panonychus citri)
- *Ácaro Rojo (Tetranychus Urticae)
- *Ácaro blanco (Polyphagotarsonemus latus)
- Psílido Asiático (Diaphorina citri)
- *Chicharritas







Con Portal

*. Se ha comprobado control en estudios de Dictamen Técnico y pruebas de campo. El registro de este uso específico se encuentra en Trámite ante COFEPRIS.

